

Farmakologická liečba refraktérneho status epilepticus, [Drug treatment of refractory status epilepticus.]

[Article in French]

[Rossetti AO](#), [Santoli F](#).

Service de neurologie, CHU Vaudois, université de Lausanne, BH-07, 44, rue du Bugnon, 1011 Lausanne, Suisse.

Status epilepticus (SE), refraktérny na liečbu benzodiazepínmi a inými antiepileptickými látkami, je riešiteľný pomocou intravenózných anestetík, ako thiopental, propofol alebo midazolam. Tieto lieky vykazujú dosť rozdielne farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti a v tejto indikácii neboli doposiaľ porovnávané v prospektívnej štúdii. Ich použitie je jednoznačne odôvodnené pri liečbe status epilepticus (SE), ktorý je sprevádzaný výskytom generalizovaných kŕčov, kým iné formy SE „partial-complex“, či SE s absenciami, sú vo všeobecnosti zvládané menej agresívnym spôsobom. Dôvodom je ich, vo všeobecnosti, lepšia prognóza. Najdôležitejším aspektom spoločným pre použitie týchto anestetík je ich správne použitie v správnom čase ako „lieku voľby“. Cieľom je dosiahnutie útlmu hrotnej EEG aktivity na 24 hodín. Dávkovanie anestetík má byť riadené podľa EEG monitoringu. Keď je použitie i. v. anestetík neúspešné, je potrebné použiť iné postupy. Popisované je i použitie inhalačných anestetík.

PMID: 19268335 [PubMed - as supplied by publisher]

Related Articles

- [ReviewRefractory generalised convulsive status epilepticus : a guide to treatment.](#) [CNS Drugs. 2005]
- [ReviewWhich anesthetic should be used in the treatment of refractory status epilepticus?](#) [Epilepsia. 2007]
- [Refractory status epilepticus: effect of treatment aggressiveness on prognosis.](#) [Arch Neurol. 2005]
- [ReviewTreatment of refractory status epilepticus with pentobarbital, propofol, or midazolam: a systematic review.](#) [Epilepsia. 2002]
- [ReviewTreatment of status epilepticus in children.](#) [Paediatr Drugs. 2001]

[» See Reviews...](#) | [» See All...](#)